

Đak Đoa, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 4 NĂM 2020
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 5 NĂM 2020

I/. TÌNH HÌNH CHUNG:

1/. Thời tiết khí hậu: Trong thời gian qua trên địa bàn huyện khí hậu nắng nóng nhiệt độ tăng cao, chiều và tối có mưa rải rác, biên độ nhiệt ngày và đêm cao. Một số cây trồng khác sinh trưởng phát triển bình thường.

2/. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây trồng:

- **Cây lúa:** Diện tích lúa Đông xuân: 2.220ha
 - + Trà sớm: GĐST: Chín - thu hoạch Ngày gieo: 04/12/2019.
 - + Trà chính vụ: Làm đòng - trổ Ngày gieo: 30/12/2019.
- **Cây rau:** (Họ Thập tự): DT 05ha. Các giai đoạn sinh trưởng.
- **Cây tiêu:** DT: 3.480,9ha
 - + Kinh doanh: 1.643ha GĐST : Chăm sóc
 - + Kiến thiết cơ bản: 1.710,9 GĐST: Chăm sóc
- **Cà phê:** DT: 26.884 ha (cà phê tái canh 409ha, cà phê trồng mới 84ha).
 - + Kinh doanh: GĐST: Quả non
 - + Kiến thiết cơ bản: GĐST: chăm sóc.
- **Cao su:** Diện tích: 7.535 ha.
 - + Kinh doanh: GĐST: Khai thác
 - + Kiến thiết cơ bản: chăm sóc

II/. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 4 NĂM 2020

1. Cây lúa:

Tuyến trùng gây hại với TLB TB 6,0% cao 20% DTN nhẹ 50ha. Đóm nâu gây hại với TLB TB 10% cao 26% DTN nhẹ 100ha. Sâu cuốn lá nhỏ, nghệt rế, lem lép hạt gây hại rải rác.

2. Cây cà phê:

Bệnh rỉ sắt gây hại với TLB từ 16,0% - 19% DTN nhẹ 75 ha. Bệnh khô cành gây hại với TLB từ 2,0% - 25% DTN nhẹ 50 ha. Một đục cành gây hại với TLB từ 2,0% - 25 % DTN nhẹ 45 ha, rệp sáp gây hại với TLB từ 5,0% - 25 % DTN nhẹ 90 ha. Rệp vảy gây hại với TLB từ 2,0% - 25 % DTN nhẹ 30 ha, đóm mắt cua gây hại rải rác.

3. Cây hồ tiêu:

Tuyến trùng rễ gây hại với TLH từ 2,0% - 20,0% DTN 100 ha (nhẹ 80 ha - TB 10 ha - nặng 10 ha). Thán thư lá gây hại với TLB từ 5,0% - 10% DTN nhẹ 80ha, Bệnh vàng lá thối rễ tơ (chết chậm) gây hại với TLB từ 3,0% - 20,0% DTN 120 ha (nhẹ 100ha -TB 10 ha- nặng 10 ha). Bệnh héo chết nhanh gây hại với TLB từ 2,0% - 20%

DTN 04 ha(nhẹ 02ha - TB 01ha - Nặng 01ha). Bệnh đốm đen mặt dưới lá gây hại với TLB từ 4,0% - 10% DTN nhẹ 75ha)

4. **Cây cao su:** Bệnh phấn trắng gây hại với TLB từ 12% - 41% DTN 210 ha(nhẹ 150ha - TB 50ha).

5. **Cây lâm nghiệp:** Sâu, bệnh bình thường

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH THÁNG 5 NĂM 2020

1/. Cây lúa: Bọ trĩ, nghệt rẻ, đốm nâu, lem lép hạt...tiếp tục gây hại.

2/. Cây rau: (họ thập tự): Bọ nhảy, sâu xanh, thối nhũn... tiếp tục gây hại.

3/. Cây cà phê: Rỉ sắt, rệp vảy, rệp sáp, khô cành, mọt đục cành... tiếp tục gây hại.

4/. Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh thán thư lá, vàng lá thối rễ tơ (chết chậm), héo chết nhanh, rệp sáp gốc... tiếp tục gây hại.

5/. Cây cao su: Sâu bệnh rải rác

IV. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1/. Trên cây lúa:

- Thường xuyên theo dõi đồng ruộng, thu hoạch những diện tích lúa đã chín ở trà sớm. Những diện tích đã thu hoạch xong tiến hành làm đất chuẩn bị cho vụ mùa.

- Khuyến cáo bà con áp dụng các chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, ICM ngay từ đầu vụ để hạn chế sâu bệnh.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện các đối tượng dịch hại và có biện pháp phòng trừ kịp thời.

2/. Trên cây rau: (họ thập tự).

- Áp dụng các qui trình sản xuất rau an toàn.

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng: làm cỏ, tiêu hủy tàn dư cây bị sâu, bệnh để tránh lây lan.

- Sử dụng nguồn nước tưới sạch.

- Bón phân NPK cân đối không bón dư đạm. Tăng cường bón phân hữu cơ.

- Chọn loại rau đúng với thời vụ, giống có năng suất cao, ít bị sâu, bệnh đưa vào sản xuất.

* Nếu sản phẩm làm ra an toàn không có dư lượng thuốc BVTV khi thu hoạch phải bảo đảm thời gian cách ly sau khi phun thuốc.

3/. Cây cà phê:

- Thường xuyên vặt bỏ chồi vượt, cắt bỏ cành bị sâu bệnh hại nặng đem ra ngoài tiêu hủy.

- Tưới đủ lượng nước, có thể kết hợp rải RIC 10WP mùa khô dùng cho cây cà phê.

- Bệnh khô cành: Khi bị bệnh có thể dùng một số thuốc hóa học như: **Bavistin 50FL, Antracol 70 WP** ... phun khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đối với rệp vảy, rệp sáp: giám sát diễn biến sự gia tăng của các loại rệp, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ như: **Cypermap 25EC, Mapy 400EC, Mapjudo 40WP, Applaud 10WP, Cáo Sa Mạc 700EC, Dragoan** ... kết hợp dầu khoáng SK để phòng trừ.

Nông độ và liều lượng pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên chai, vỏ bao bì thuốc. Phun thuốc trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

4/. Cây tiêu:

- Thường xuyên thăm vườn phát hiện tình hình sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Tiến hành vệ sinh vườn cây, cắt bỏ cành lá bị sâu bệnh, thu gom tàn dư cây bị bệnh đem tiêu hủy phòng bệnh cho cây tiêu.

- Đối với những diện tích bị bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng gây hại nặng cần thu gom và đem ra khỏi vườn tiêu hủy.

- Đối với bệnh vàng lá thối rễ tơ (chết chậm) và tuyến trùng gây hại sử dụng thuốc BVTV *Tervigo 020SC 300ml + Ridomil Gold 68WP 600g* pha vào 200lít nước dùng để tưới gốc, tưới 4-5 lít nước thuốc/gốc.

- Đối với bệnh thán thư, đốm đen mặt dưới lá sử dụng các loại thuốc như *Tilt super 300EC, Bordeaux 1%, Antacol 70WP...* để phòng trừ, có thể phun 1-3 lần tùy tình hình bệnh hại trên vườn, các lần cách nhau 10-15 ngày.

Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật cơ bản giúp cho bà con thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng. Đề nghị UBND các xã vận động bà con nông dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu, bệnh gây hại và phòng trừ. *ĐHT*

Nơi nhận:

- Huyện ủy Đak Đoa (B/c)
- UBND Huyện (B/c)
- Chi cục TT&BVTV Tỉnh Gia Lai (B/c)
- Phòng NN&PTNT huyện (P/h)
- 17 xã và thị trấn (T/h)
- Lưu: Trung tâm.

ĐHT **GIÁM ĐỐC**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Nghĩa